


※この説明書は、使用前によくお読みください。
また、使用が終わるまでお手元に保存してください。

1567

A(0608)

水のいらない胃腸薬

チュアブルゲリン



チュアブルゲリンはチュアブル錠で、水なしでかむか、口中で溶かして飲めるタイプの胃腸薬です。
多忙な現代人のライフスタイル（工作中、運転中、通勤途中、お出かけ先）に気軽に服用できます。



使用上の注意

してはいけないこと



（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

1. 次の人は服用しないでください。透析療法を受けている人
2. 長期連用しないでください。

相談すること



1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (3) 薬によりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある人。
 - (4) 次の診断を受けた人。腎臓病
2. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
3. 次の症状があらわれる事があるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
便秘、下痢

効能・効果

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、もたれ（胃もたれ）、胃重、胸つかえ、げっぷ（おくび）、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、飲みすぎ（過飲）、胃痛

用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間の空腹時、かむか、口中に溶かして服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	1錠	3回
小児（15歳未満）	服用しないこと	

※食間とは、食後2時間ほど経過し、胃の中に食べたものがほぼなくなっている時です。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 本剤は、用法・用量を厳守してください。
- (2) 錠剤の取り出し方：右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突きささる等思わぬ事故につながります）

(PTPシートの取り出し図)



成分・分量（1日量3錠中）

粘膜修復剤	アルジオキサ	300mg	胃・十二指腸潰瘍の荒れた部位に直接作用して修復、保護します。
制酸剤	合成ヒドロタルサイト	840mg	過剰に分泌された胃酸を持続的に中和し、胸やけ、胃の痛みに効果をあらわします。抗ペプシン作用があり、胃粘膜を保護します。
制酸剤	炭酸マグネシウム	400mg	速効的に胃酸を中和して、げっぷ、胸やけ、胃酸過多に効果をあらわします。

添加物としてL-メントール、アスパルテーム（L-フェニルアラニン化合物）、黄色4号（タートラジン）、その他3成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4) 配置期限のすぎた製品は使用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、下記にお願いいたします。

内外薬品株式会社 お客様相談窓口 富山県富山市三番町3-10
☎076(421)5531 受付時間 9:00~17:00（土、日、祝日を除く）



製造販売元
内外薬品株式会社
富山県富山市三番町3-10