

かぜの諸症状の緩和に

こうそさん  
**香蘇散配合**

**カゼンエス**

非ピリン系  
 かぜ薬顆粒

●特徴●

- 胃腸が弱い人の「かぜ」に古くから用いられている「香蘇散」を配合しています。
- 6つの成分がはたらいて「かぜ」による、発熱、せき、鼻水、痛みなどの諸症状を緩和します。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

- 次の人は服用しないでください
  - 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください  
 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください（眠気があらわれることがある）
- 服用時は飲酒しないでください
- 長期連用しないでください



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
  - 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 水痘（水ぼうそう）若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児（15歳未満）。
  - 本人又は家族がアレルギー体質の人。
  - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - 次の症状のある人。 高熱、排尿困難
  - 次の診断を受けた人。 心臓病、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
  - 服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症 状        | 関係部位  | 症 状  |
|------|------------|-------|------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ  | 精神神経系 | めまい  |
| 消化器  | 悪心・嘔吐、食欲不振 | その他   | 排尿困難 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称  | 症 状  |
|--|--|
| ショック<br>(アナフィラキシー)                                   | 服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。  |
| 皮膚粘膜眼症候群<br>(ステアース・ジョンソン症群)<br>中毒性表皮壊死症<br>(ライエル症候群) | 高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。   |
| 肝機能障害  | 全身のだるさ、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）等があらわれる。   |
| 間質性肺炎  | 空せき（たんを伴わないせき）を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。<br>(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。) |
| ぜんそく   |  |

(2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください  
 □のかわき

### ■効能・効果■

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和。

### ■用法・用量■

次の1回量を1日3回、食後なるべく30分以内に服用する。

| 年 齢        | 1回量        | 1日服用回数 |
|------------|------------|--------|
| 成人(15歳以上)  | 1包         | 3回     |
| 11歳以上15歳未満 | 2/3包       |        |
| 7歳以上11歳未満  | 1/2包       |        |
| 3歳以上7歳未満   | 1/3包       |        |
| 3歳未満の小児    | 服用しないでください |        |

### <用法・用量に関連する注意>

- (1)本剤は用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

### ■成分・分量3包(成人の1日服用量)中■〔1包量1500mg〕

| 成 分   | 分量     | 主な作用                                     |
|---|--------|--|
| アセトアミノフェン   | 540mg  | 「かぜ」による発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛みに効果をあらわします。      |
| エテンザミド  | 600mg  |  |
| ノスカピン   | 30mg   | せきの中枢に働いて、せきをしずめます。                      |
| クロルフェニラミンマレイン酸塩   | 7.5mg  | 「かぜ」のひきはじめにみられる鼻水、鼻づまり、くしゃみなどに効果をあらわします。 |
| 無水カフェイン   | 120mg  | 脳の血管に働いて「かぜ」による頭痛をしずめます。                 |
| 香蘇散<br>〔コウブシ末 800mg〕<br>〔ソヨウ末 400mg〕<br>〔チンピ末 600mg〕<br>〔ショウキョウ末 200mg〕<br>〔カンゾウ末 200mg〕<br>の混合粉末 | 2200mg | 胃腸の弱い人の「かぜ」に古くから用いられ悪寒、頭痛などに効果があります。     |

添加物として、乳糖、アスパルテーム（L-フェニルアラニン化合物）、デヒドロ酢酸Na、その他2成分を含有する。

### ■保管及び取扱い上の注意■

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる）
- (4)1包を分割して服用した残りを使用する場合は、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5)使用期限のすぎた製品は使用しないでください。



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。

内外薬品株式会社 お客様相談窓口 富山県富山市三番町3-10  
 ☎076(421)5531 受付時間 9:00~17:00（土、日、祝日を除く）



製造販売元  
**内外薬品株式会社**  
 富山県富山市三番町3-10