

服用前にこの説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるように保管してください。

1746  
A(0418)

## 頭痛・発熱・関節痛

(非ピリン系)

### 解熱鎮痛薬

# ケロリンT<sup>®</sup>

#### 【特徴】

非ピリン系解熱鎮痛剤、アセチルサリチル酸、アセトアミノフェンは、温熱中枢及び痛覚中枢に働いて悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛みにすぐれた効果をあらわします。

さらに無水カフェインが脳血管に働いて、頭痛をやわらげます。



#### 使用上の注意

#### してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起りやすくなる)

#### 1. 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- (3) 15才未満の小児。
- (4) 出産予定日12週以内の妊婦。

#### 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬

#### 3. 服用前後は飲酒しないでください

#### 4. 長期連用しないでください

#### 相談すること



#### 1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) 高齢者。
- (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6) 次の診断を受けた人。

心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍

#### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、青あざができる
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胸やけ、胃もたれ、腹痛、下痢、血便、胃腸出血
精神神経系	めまい
その他	鼻血、歯ぐきの出血、出血が止まりにくい、出血、発熱、のどの痛み、背中の痛み、過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

症状の名称	症 状
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。

3. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って  
医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

### 効 能

- (1)頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛。  
(2)悪寒・発熱時の解熱。

### 用法・用量

次の1回量を1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用してください。服用間隔は6時間以上おいてください。

年 齢	1回量	1日服用回数
15才以上(大人)	1包	2回
15才未満	服用しないこと	

### <用法・用量に関連する注意>

- (1) 本剤は、定められた用法・用量を厳守してください。

### 成分・分量(1包中)〔1包量900mg〕

アセチルサリチル酸	600mg
アセトアミノフェン	100mg
無水カフェイン	60mg
ケイヒ末	60mg

添加物としてバレイシヨデンプンを含有

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。  
(2) 小児の手のとどかない所に保管してください。  
(3) 他の容器に入れ替えしないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)  
(4) 配置期限をすぎた製品は服用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、下記にお願いいたします。  
富山めぐみ製薬株式会社 お客様相談窓口 ☎076 (421) 5531  
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)