

※この説明書は、使用前によくお読みください。

1584 なお、使用が終わるまでお手元保管してください。

A(0608)

鼻炎用内服薬

## プロピン鼻炎J II

## 【特徴】

従来、くしゃみ、鼻みず、鼻づまりと言え、かぜの代名詞のように言われてきましたが、最近では、花粉やハウスダストによって起こるアレルギー性の鼻炎にかかる人が大変増えています。いずれの場合にも、早めに治さないと鼻みずや鼻づまりが更にひどくなり、不快症状が続いてなかなか治らなくなってしまいます。鼻にきたら、この**プロピン鼻炎J II**服用すると鼻みず、鼻づまりが緩和され、鼻の通りがよくなってきます。また頭重やなみだ目といった不快症状も同時におさまってきます。**プロピン鼻炎J II**は、7歳のお子様から大人まで服用していただける飲みやすい小さなカプセルです。早速お試しください。



## 使用上の注意

## してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

## 1. 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 次の症状のある人。 前立腺肥大による排尿困難
- (3) 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病

## 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）、塩酸フェニルプロパノールアミンを含有する内服薬（かぜ薬、鎮咳去痰薬）

## 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

（眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがある。）

## 4. 長期連用しないでください

## 相談すること



## 1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6) 次の症状のある人。
- (7) 高熱、排尿困難、むくみ
- (8) 次の診断を受けた人。
- (9) 緑内障、腎臓病
- (10) モノアミン酸化酵素阻害剤（塩酸セレギリン等）で治療を受けている人。

## 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

| 関係部位  | 症 状                |
|-------|--------------------|
| 皮膚    | 発疹・発赤、かゆみ          |
| 消化器   | 悪心・嘔吐、食欲不振         |
| 精神神経系 | めまい、不眠、神経過敏、頭痛     |
| その他   | 排尿困難、顔のほてり、異常なまぶしさ |

まれに下記の重篤な症状が起ることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称              | 症 状   |
|--------------------|---|
| ショック<br>(アナフィラキシー) | 服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しき等があらわれる。 |
| 偽アルドステロン症          | 尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。         |

(2) 5～6日間服用しても症状がよくならない場合。

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

口のかわき、便秘

### 効能・効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みず（鼻汁過多）、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重（頭が重い）

### 用法・用量

次の1回量を1日3回、毎食後に服用してください。

| 年 齢       | 1回量        | 1日服用回数 |
|-----------|------------|--------|
| 大人（15歳以上） | 2カプセル      | 3回     |
| 7歳以上15歳未満 | 1カプセル      |        |
| 7歳未満      | 服用しないでください |        |

### <用法・用量に関連する注意>

- (1) 本剤は定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し（PTPシートの取り出し図）て裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。  
(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります)



### 成分・分量 大人1日量（6カプセル）中

| 成 分               | 分 量   |
|-------------------|-------|
| d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 6mg   |
| ベラドンナ総アルカロイド      | 0.4mg |
| 塩酸プソイドエフェドリン      | 180mg |
| 無水カフェイン           | 120mg |
| グリチルリチン           | 60mg  |

添加物としてトウモロコシデンプン、ステアリン酸Mg、ラウリル硫酸Na、ゼラチン、その他2成分を含有します。

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) 配置期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本品についてのお問い合わせは下記にお願いいたします。

内外薬品株式会社 お客様相談窓口 富山県富山市三番町3-10

☎076 (421) 5531 受付時間 9：00～17：00（土、祝日を除く）



製造販売元  
**内外薬品株式会社**  
富山県富山市三番町3-10