

ずつう・はいた・発熱の緩和に
非アスピリン製剤

解熱鎮痛薬

小児用ケロリン錠S

小児用**ケロリン錠S**に配合されているアセトアミノフェンは解熱作用、鎮痛作用がすぐれ、熱と痛みの中樞に働いてよく効果をあらわします

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬

3. 服用時は飲酒しないでください

4. 長期連用しないでください

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6) 次の診断を受けた人。

心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステイブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。
ぜんそく	

(2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合。

効能・効果

頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・外傷痛の鎮痛。悪寒・発熱時の解熱。

用法・用量

次の1回量を1日3回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。

年 齢	1回量	1日服用回数
11才以上15才未満	6錠	3回
7才以上11才未満	4錠	3回
3才以上7才未満	3錠	3回
3才未満	服用しないこと	

(用法・用量に関連する注意)

- 定められた用法、用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 本剤は3才未満の乳幼児には服用させないでください。なお、3才以上であっても幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意してください。

成分・分量(1錠中)

アセトアミノフェン……………30mg

添加物としてサッカリンNa、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、カルメロースCa、香料、プロピレングリコール、バニリン、その他2成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手のとどかない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- 配置期限(外箱に書いてあります)をすぎた製品は服用しないでください。



本剤に関するお問い合わせは、下記にてお願い致します。
 内外薬品株式会社 「お客様相談窓口」 富山県富山市三番町3-10
 (電話076-421-5531) 受付時間：9時～17時(土、日、祝日を除く)

株式会社 廣 貫 堂

製造販売元 内外薬品株式会社
 富山県富山市三番町3-10